

511 ESTUDIO DE PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES MEDIANTE ANÁLISIS COPROPARASITOLÓGICOS SERIADOS EN CANINOS.

Pérez Tort, G. ^{1,2}; Sigal, G. ³; Gueijman, J.²; Cwirenbaum, R. ²; Petetta, L. ²; Rodríguez, E. ⁴


¹ Area De Parasitología Y Enfermedades Parasitarias ,Fac.. CsVet. Universidad de Buenos Aires

² Hospital Veterinario De Virreyes, Acceso Norte 2502, San Fernando, Pcia De Buenos Aires, Argentina. E mail: gabrielapt@hotmail.com

³ Vetanco S.A. Chile 33 Vicente López , prov. de Buenos Aires

⁴ Area de estadística , Fac. Cs Vet. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires


Objetivo: establecer la prevalencia de las parasitosis entéricas caninas en pacientes que concurren a nuestra consulta, estudiándolos por: ubicación geográfica de su vivienda, época del año, grupo etario y sexo.




Materiales y métodos: Se analizaron 506 muestras provenientes de caninos que concurren a consulta, entre 1999 y 2001 oriundos de distintas localidades del Norte del Gran Buenos Aires y Buenos Aires (capital), mayores de 2 meses, que habiendo sido desparasitados entre los 15 días y el mes de vida no hubieran posteriormente recibido prevención de enfermedades endoparasitarias, los caninos fueron separados en tres grupos : menores de un año: 259 , entre 1 y 8 años 190 y animales mayores de ocho años :57. 286 perros eran machos y 220 fueron hembras. Se tomó nota del lugar de procedencia de cada animal Se realizaron estudios de muestras seriadas de tres deposiciones diferentes de cada animal, en fresco (conservados entre 4 y 8 °C). Cada muestra fue procesada mediante los siguientes métodos de enriquecimiento: Flotación de Sheater, Sulfato de zinc, Sedimentación.

Resultados: Hubo diferencias significativas entre los porcentajes de positividad en las distintas categorías etarias para algunas parasitosis, así como también se observaron diferencias de acuerdo a las distintas localidades de donde provenían los animales

Porcentaje de animales afectados por cada parásito



Porcentaje de animales positivos a algún parásito, por grupo etario



Prevalencia por edad

Conclusión: Se observó la alta prevalencia de numerosas parasitosis entéricas que son causa de enfermedades más o menos graves, de los caninos en todas las edades, no sólo en los cachorros de corta edad.

Los autores agradecen a los colegas y pasantes del Hospital Veterinario de Virreyes por su valiosa colaboración.